FT 5	Reicher Silikat-Fichten-Tannenwald
nT2Tdr	*Galio rotundifolii-Abietetum (Oxali-Abietetum) dryopteridetosum*

Exposition



Hangneigung



Geländeform



Nährstoff- & Wasserhaushalt



Höhenstufe



Bodenprofil

(Bsp. Braunerde podsolig*)*



Gesteine

intermediärer (bis basenreicher) Silikat-Hangschutt, tonreichere Lockersedimente

Boden

frische bis sehr frische, feinerdereiche, eutrophe Braunerden, selten Kolluvien oder Ranker; u.U. skelettreich bis schuttig, selten podsolig

Humus

moderartiger Mull oder mullartiger Moder (sekundär Moder)

Bodeneigenschaften

Gründigkeit	s. flach	flach	**mittel**	tief	s. tief
Skelettgehalt	vorwieg.	s. hoch	hoch	mäßig	gering
Bodenart	s. leicht	leicht	**mittel**	schwer	s.schwer
Wasser - Speicherung	s. gering	gering	mittel	**hoch**	s. hoch
- Versickerung	s. hoch	hoch	**mittel**	gering	s. gering

Abflussbeiwert 0 | **1** | 2 | 4 | 5 | 6

Häufige Übergänge zu anderen Waldtypen

+	Wasser	Nährstoffe	Seehöhe	
	FT7		Fs10	schuttig
	FT5	**FT5**	**FT5**	blockig Fi11
	FT1 / Fi1	FT1 / Fi1	Lh3 / Lh5	lawinar Fs10
				erosiv Er1